


Rakovina děložního čípku



Na obrázku vidíte zvětšeninu HPV

Rakovina děložního čípku patří spolu s rakovinou prsu, děložního těla a tlustého střeva k nejrozšířenějším ženským nádorovým onemocněním. U tohoto typu rakoviny byla prokázána přímá souvislost mezi virovou nákazou a následným onemocněním. V České republice je rakovina děložního čípku každým rokem diagnostikována u cca 1000 žen, z nichž téměř 400 této nemoci podlehnou. Přednádorový stav se přitom vyvíjí mnoho let a lze jej odhalit dříve, než dospěje až do stadia rakoviny.

Rakovina děložního čípku a virus HPV

Virus zodpovědný za onemocnění rakovinou děložního čípku se nazývá HPV – Human papillomavirus. Existuje více než 100 typů tohoto viru a většina z nich je neškodná. Pohlavním stykem se mezi lidmi šíří kolem 40 typů viru, jež se dělí podle rizikovosti. Méně rizikové typy HPV jsou příčinou onemocnění typu genitálních bradavic, rizikovější viry ovšem způsobují změnu buněk na povrchu děložního čípku, z nichž se právě může vyvinout rakovina. Změny buněk na děložním hrdle lze odhalit při gynekologickém vyšetření.

Na tomto místě je dobré upozornit, že lidský papillomavirus se přenáší sexuálním kontaktem (nikoli tedy pouze stykem, ale klidně i pouhým dotykem) a ani kondom zde není dostatečně spolehlivou ochranou. S infekcí HPV se setká až 80% žen, u většiny z nich však infekce samovolně odezní. U některých však infekce neodezní, a právě u jím hrozí zvýšené riziko onemocnění rakovinou děložního čípku. Během života může docházet k infekci HPV opakovaně.

Rakovina děložního čípku - jak se chránit?

Samozřejmostí by měly být pravidelné kontroly u ženského lékaře, které jsou běžně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Lékař provede tzv. cytologické vyšetření, neboli stěr děložního čípku, který následně pošle k rozboru do laboratoře. V laboratoři určí, zda se na děložním čípku nacházejí či nenacházejí nějaké změněné buňky.

Další preventivní opatření představuje **očkování** proti papillomaviru. V naší republice se proti HPV očkuje už od prosince 2006, k dispozici je vakcína prodávaná pod názvem Silgard nebo Gardasil. Lékaři se spoléhají na to, že díky této vakcíně by mohla být rakovina děložního čípku do budoucna vymýčena úplně.



© Napsala Hanka Janoušková

Redaktorka pro oblast vztahy a zdraví
Mindsoft s.r.o.

Email: janouskova@mindsoft.cz
www.mujevztah.cz www.mamdepku.cz
www.foto-mluvi.cz

Tento článek můžete využít pro své potřeby, pokud uvedete
informace o autorovi, jeho email a odkaz na www stránky.

Měsíčník osobního růstu zdarma: [objednejte si](#)